Umfrage zur Antibiotika-Prophylaxe vor urologischen diagnostischen Maßnahmen (Urodynamik = UDU, Urethro-Cystoskopie = UC) und vor Botox-Injektionen in den Detrusor - bei Patienten mit nBFS

1) Hat jemand im urologischen Team eine Ausbildung (antibiotic stewardship) zum
   - ☐ ABS-Beauftragten oder
   - ☐ ABS-Experten abgeschlossen?

2) Erhalten Patienten (ohne klinische Zeichen eines HWI) vor UDU / UC eine prä-interventionelle Antibiose?
   - ☐ ja, immer, alle
   - ☐ nur Patienten mit Dauerkatheter (DK oder SPK)
   - ☐ nein, nie
   - ☐ ja, bei positiver prä-intervent. mikrobiolog. Diagnostik:
     - ☐ Bakteriurie ≥.....
     - ☐ Leukozyturie ≥..... (Methodik:…….)
     - ☐ beides wurde nachgewiesen
   - ☐ Pat. ohne klin. Zeichen eines HWI, aber mit folgender positiver mikrobiolog. Diagnostik werden abgesetzt:
     - ☐ Urinkultur ≥ …… KBE/ml ☐ Leuko ≥ …... /mm^3 (Methode: …….)
   - ☐ Andere Strategie: ……..

3) Wird regelhaft vor der UDU / UC eine mikrobiologischer Diagnostik durchgeführt?
   - ☐ nein
   - ☐ ja – welche?
     - ☐ Teststreifen (Nitrit und Leukozyten-Esterase)
     - ☐ Urinstatus (Sediment)
     - ☐ Leukozyten-Kammerzählung (Nativ-Urin)
     - ☐ Urin-Kultur

4) Wenn vor UDU/UC eine prä-interventionelle Antibiose gegeben wird: bitte Medikament, Dosis und Dauer angeben:
……..... oder: ☐ individuell – testgerecht

5) Erhalten Patienten vor Botox-Detrusor eine prä-interventionelle Antibiose?
   - ☐ ja, immer, alle
   - ☐ nein, nie
   - ☐ ja, bei positiver prä-intervent. mikrobiolog. Diagnostik:
     - ☐ Bakteriurie ≥.....
     - ☐ Leukozyturie ≥.....(Methodik:…….)
     - ☐ beides wurde nachgewiesen

6) Wenn vor Botox-Detrusor eine prä-interventionelle Antibiose gegeben wird: bitte Medikament, Dosis und Dauer angeben: ……..... oder: ☐ individuell – testgerecht

7) Prä-operative Diagnostik und Konsequenz vor Botox-Detrusor:
   - ☐ Urin-Kultur vor der Op. steril: Op. wird durchgeführt (ohne Betrachtung der Leuko´s)
   - ☐ Urin-Kultur vor der Op. steril: Op. wird dennoch abgesetzt, wenn Leuko ≥ …… (Methodik:……)
   - ☐ Keine Kultur, aber Leukozyten-Zählkammer vor der Op. – Op. wird abgesetzt, wenn Leuko ≥ ……
   - ☐ Keine Kultur, aber Urinstatus (Sediment) vor der Op. – Op. wird abgesetzt, wenn Leuko ≥ ……
   - ☐ Keine Kultur, kein Urinstatus: Op. wird durchgeführt, wenn keine klinischen HWI-Symptome vorliegen
   - ☐ Andere Strategie: ……..

DANKE! Bitte ausfüllen und per E-Mail an: r.boethig@bgk-hamburg.de

Oder einscannen und als Fax: +49-40-7306-2621